

АСФИКСИЯ у детей первого года и ее профилактика

Механическая асфиксия (удушье) – задержка дыхания более 20 секунд из-за механического препятствия (сдавление шеи, грудной клетки, живота), закрытие просвета дыхательных путей слизью, пищевой, мягкими или твердыми предметами.

Асфиксия вследствие нарушения поступления кислорода в дыхательные пути сопровождается нарушением самочувствия, изменением цвета кожи (синюшность или бледность), выраженным резким снижением мышечного тонуса, вялостью. **Может стать причиной смерти ребенка.**

У младенцев это состояние может быть вызвано:

- ✓ прикрытием дыхательных путей ребенка посторонними предметами: подушкой, одеялом, игрушкой;
- ✓ прикрытием дыхательных путей грудью матери во время кормления;
- ✓ попаданием инородных тел в дыхательные пути: мелких игрушек, пуговиц, колец, монет и т.д.
- ✓ поперхиванием и попаданием молока или другой пищи в гортань, иногда – в бронхи;
- ✓ частыми срыгиваниями;
- ✓ сдавливанием области шеи цепочками или тесьмой (при ношении крестиков, талисманов, соски);
- ✓ сном в одной кровати с родителями, другими детьми.



Признаки механической асфиксии:

- ✓ отсутствие дыхания более 20 секунд
- ✓ вялость, необычная слабость мышц
- ✓ бледный, синюшный оттенок кожи

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

Если вы заметили эти признаки – немедленно вызовите скорую медицинскую помощь по телефонам 103 и 112!

Не теряйте самообладания, ребенку нужна ваша помощь!

- ✓ Проверьте частоту дыхания, приблизившись ко рту и носу ребенка, стараясь уловить движение грудной клетки.
- ✓ Убедитесь, что в трахее нет посторонних предметов, открыв рот и немного запрокинув голову ребенка назад. При их наличии постараитесь освободить дыхательные пути.
- ✓ Обеспечьте приток свежего воздуха, приоткрыв окно.
- ✓ Оцените цвет кожи: об остановке дыхания свидетельствует бледность кожных покровов и посинение губ.
- ✓ До приезда скорой помощи при остановке дыхания и отсутствии сердцебиения, начинайте делать массаж сердца и одновременно искусственное дыхание.



Профилактика асфиксии

- Никогда не укладывайте ребенка сразу после кормления. Вместе с едой малыши проглатывают воздух; чтобы избавиться от него, нужно некоторое время поддержать ребенка вертикально.
- Не укладывайте ребенка на мягкую перину, подушку. Детский матрас должен быть полужестким.
- Выбирайте детское постельное белье и одежду, избегайте всевозможных завязок. Не накрывайте ребенка одеялами, используйте конверт для сна.
- Не пеленайте ребенка туго. Малыш должен спать на спине или на боку.
- Не используйте для поддержания ребенка на боку подушки, мягкие игрушки.
- Не надевайте на шею ребенка цепочки, тесемки, шнурки с сосками, крестиками и другими предметами.
- Не следует оставлять надолго старших детей одних около грудного ребенка, надеясь на их возраст и рассудительность.



- Совместный сон в одной кровати с родителями (и с другими детьми) небезопасен – он может стать причиной удушения малыша.
- Исключите из зоны досягаемости ребенка мелкие предметы, они могут попасть в дыхательные пути или желудок.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!



ГКУЗ НСО
«Региональный центр
медицинской профилактики»
www.rcmp-nso.ru

